Deux albinos du sud-est brésilien dans la tribu Maxillariae (Orchidaceae)[1]

Guy R. Chiron[a] & Vitorino P. Castro Neto[b]

Mots clés : Brésil, *Chytroglossa*, Orchidaceae, *Rodrigueziella*, formes albinos.

Résumé
Deux formes albinos, l'une de *Rodrigueziella handroi*, l'autre de *Chytroglossa aurata*, sont décrites.

Abstract
Two albinos forms, of *Rodrigueziella handroi* and *Chytroglossa aurata*, are described.

Sumário
Duas formas albinas, uma de *Rodrigueziella handroi*, a outra de *Chytroglossa aurata*, são descritas.

Au cours des deux années écoulées, nous avons pu étudier deux variantes albinos d'orchidées du sud-est brésilien. L'une a été découverte par le premier auteur aux environs de Corrego da Fortuna (Espirito Santo), vers 1 000 m d'altitude, sous la conduite du regretté Michel Frey ; l'autre a été collectée par Carlos Régent dans la région de Nova Friburgo (Rio de Janeiro), là encore aux alentours de 1 000 m d'altitude. Ni l'une ni l'autre n'ayant été antérieurement officiellement validée, nous les décrivons ci-après au rang de formes.

Rodrigueziella handroi* (Hoehne) Pabst *forma icterina* Chiron & V.P. Castro, *forma nova

Rodrigueziellae handroi forma sine pigmento erythrino.

[1] manuscrit reçu le 11 décembre 2006, accepté le 3 janvier 2006

Type : Brésil, Espirito Santo, vers Corrego da Fortuna, altitude 1 000 m environ, collecté en novembre 2005, fleuri en culture en août 2006, *Chiron05761* (SP).

Etymologie : l'épithète sub-spécifique se rapporte à la couleur des fleurs.

Hoehne[2] a décrit *Theodora (Rodrigueziella) handroi* comme ayant des fleurs « vert clair avec les segments ornés de trois lignes pâles et indécises de marron brun et le centre du labelle jaune avec des taches brunâtres ». Les plantes ordinaires de *Rodrigueziella handroi* produisent effectivement des fleurs ainsi colorées. La variante décrite ici possède des tépales entièrement jaune verdâtre et un labelle jaune, sans aucune trace de couleur différente. A tous autres égards, elle est identique aux plantes typiques de l'espèce. Voir photographies page 69.

Chytroglossa aurata* Reichenbach f. *forma luteoviridis* V.P. Castro & Chiron, *forma nova

Chytroglossae auratae forma sine pigmento erythrino.

Type : Brésil, Rio de Janeiro, alentours de Nova Friburgo, collecté par Carlos Régent, fleuri en septembre 2006, *Régent s.n.* (SP).

Etymologie : l'épithète sub-spécifique se rapporte à la couleur des fleurs.

Les plantes typiques de *Chytroglossa aurata*, telles qu'on peut les observer dans leur zone de distribution (états de Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo), produisent des fleurs à tépales verts et à labelle jaune largement taché de marron. Les fleurs de la variante albinos présentent les mêmes couleurs de fond mais le labelle est immaculé. A tous autres égards, elles sont identiques aux fleurs typiques. Voir photographies page 69.

Les auteurs remercient Carlos Régent pour la mise à disposition du matériel de la seconde forme albinos.

ph. page 69 : Guy Chiron

---

[a] 2 rue des pervenches, F-38340 VORPPE (France) – g.r.chiron@wanadoo.fr
[b] Rua Vicente Galafassi, 549 - CEP 09770-480 - S.B. do Campo, SP (Brésil)

---

[2] in Estudo monográfico do gênero Theodora Barb. Rdr. e sua relação com outros afins, do Brasil. *Arquivos de Botânica do Estado de S. Paulo*, 1(4):83-88) (1942)